



PATHS Facebook and Instagram Posts	PATHS Facebook and Instagram Posts
<p>HEADLINE 1: Medications for Opioid Use Disorder (MOUD) help you focus on what is important: You and your baby</p> <p>Medications for opioid use disorder (MOUD) give you the best chance of staying healthy and having a healthy pregnancy and baby.</p>	<p>ENCABEZADO 1: Los medicamentos para el trastorno por el uso de opioides (MOUD en inglés) le ayudan a concentrarse en lo importante: en usted y en su bebé</p> <p>Los medicamentos para el trastorno por uso de opioides (MOUD, por sus siglas en inglés) le brindan la oportunidad de tener un embarazo y un bebé saludable.</p>
<p>HEADLINE 2: Recovery checklist:</p> <p>See my health care provider. Go to support meetings. Take my medication for OUD.</p> <p>Doctors recommend buprenorphine or methadone to prevent overdose and support your recovery. That keeps you and your baby healthy.</p>	<p>ENCABEZADO 2: Lista de verificación para la recuperación: Ver a mi proveedor de cuidados de salud. Ir a reuniones de apoyo. Tomar mi medicamento para la OUD.</p> <p>Los médicos recomiendan la buprenorfina o la metadona para prevenir sobredosis y apoyar su recuperación. Eso la mantiene a usted y a su bebé saludable.</p>
<p>HEADLINE 3: Strengthen your family by supporting medication treatment for opioid use disorder</p> <p>Families play a key role in supporting loved ones with opioid use disorder, especially during pregnancy. Your support for opioid use disorder medications will help improve the health of your family for generations.</p>	<p>ENCABEZADO 3: Fortalezca los vínculos de su familia apoyando el tratamiento con medicamentos para el trastorno por el uso de opioides</p> <p>Las familias desempeñan un papel clave ayudando a los seres queridos con trastorno por el uso de opioides, especialmente durante el embarazo. Apoyar los medicamentos para el trastorno por el uso de opioides contribuirá a mejorar la salud de su familia durante generaciones.</p>
<p>HEADLINE 4: Know Your Rights! Medication treatment for opioid use disorder</p> <p>Did you know that treatment with medication for opioid use disorder, or MOUD, is protected by the Americans with Disabilities Act (ADA)?</p>	<p>HEADLINE 4: ¡Conozca sus derechos!</p> <p>Medicamento para el trastorno por el uso de opioides</p> <p>¿Sabía que el tratamiento con medicamentos para el trastorno por el uso de opioides, o MOUD, está protegido por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA)?</p>
<p>It is your right to be on MOUD while you are pregnant and after delivery. This applies to:</p> <p>Prisons and jails.</p>	<p>Tiene usted derecho a recibir MOUD durante el embarazo o después del parto. Esto se aplica a:</p> <p>Prisiones y cárceles</p>
<p>Drug court or probation offices.</p>	<p>Tribunal de drogas u oficinas de libertad condicional</p>
<p>Family court.</p>	<p>Tribunal familiar</p>

Child Protective Services.	Servicios de Protección Infantil
It is illegal for substance use disorder treatment programs to refuse services to you because you are on MOUD.	Es ilegal que los programas de tratamiento de trastorno por el uso de sustancias rechacen darle servicios por tomar MOUD.
Employers cannot refuse to hire you just for being on MOUD.	Los empleadores no pueden negarse a contratarla solo por tomar MOUD.
Know your rights. You can report an ADA violation to the assistant U.S. attorney in your district or the federal government.	Conozca sus derechos. Puede informar una violación de la ADA al fiscal asistente de los Estados Unidos en su distrito o al gobierno federal.
HEADLINE 5: Yes! You can breastfeed during treatment for opioid use disorder It is safe to take methadone and buprenorphine for opioid use disorder while breastfeeding.	HEADLINE 5: ¡Sí! Puede dar pecho o lactar durante el tratamiento para el trastorno por el uso de opioides Es seguro tomar metadona y buprenorfina para el trastorno por el uso de opioides durante la lactancia.
Breastfeeding helps you bond with your baby. And it can be part of your treatment plan if your baby develops neonatal opioid withdrawal syndrome (NOWS) after birth. Breastfeeding will help soothe your baby and can reduce withdrawal symptoms.	La lactancia también le ayuda a establecer un vínculo con su bebé. Y puede ser parte de su plan de tratamiento si su bebé desarrolla el síndrome de abstinencia de opioides neonatales (NOWS) después del nacimiento. La lactancia materna ayudará a calmar a su bebé y puede reducir los síntomas de abstinencia.
It is safe to breastfeed while taking medication for opioid use disorder. Talk with your doctor if you want to breastfeed.	Es seguro dar pecho o lactar mientras se toman los medicamentos para el trastorno por el uso de opioides. Hable con su médico si desea dar pecho o lactar.